

DEXERYL®

Glicerolo, vaselina, paraffina liquida

Crema

IT Foglio illustrativo : DEXERYL® crema
Che cosa contiene DEXERYL® crema?

Glicerolo, paraffina morbida bianca, paraffina liquida, glicerolo monostearato, acido stearico, polidimetilciclosilossano, olio di silicone, macrogol 600, trietanolamina, propil paraidrossibenzoato (E216), acqua depurata.
Tubo da 50 g e 250 g. Flacone Dispenser 500 g.

A che cosa serve DEXERYL® crema?

Crema dermoprotettiva per il trattamento dei segni e sintomi di secchezza cutanea (xerosi) in particolare in vari disturbi cutanei (quali dermatite atopica, ittiosi...).

Come agisce DEXERYL® crema?

Dexeryl® crema è formulata per il trattamento dei segni e sintomi di secchezza cutanea (xerosi) grazie a:

- l'effetto filmogeno della paraffina morbida bianca e della paraffina liquida che:
 - inibisce fisicamente l'evaporazione, prevenendo così la disidratazione (perdita di acqua)
 - ha un effetto barriera contro i danni esterni;
- inoltre, l'effetto idratante del glicerolo aiuta a mantenere l'equilibrio idrico della pelle.

Grazie alla sua formulazione, Dexeryl® crema permette ugualmente di limitare e prevenire le irritazioni.

Come usare DEXERYL® crema?

Crema solo per uso esterno. Applicare uno strato sottile di crema sulle zone di pelle da trattare una o due volte al giorno, o con maggiore frequenza se necessario, ma mai più di 6 volte al giorno.

Quando non si deve usare DEXERYL® crema?

Non si deve usare nei soggetti allergici a uno qualsiasi degli ingredienti e soprattutto al parabenzato (propil paraidrossibenzoato - E216). In considerazione dell'assenza di informazioni al riguardo, è preferibile non usare la crema insieme ad altri prodotti per uso topico. In caso di dubbio, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Avvertenze speciali e precauzioni di impiego:

Non applicare sulle ferite.

Non ingerire. Non applicare sugli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Possibili effetti avversi:

Poiché la crema contiene propil paraidrossibenzoato, può causare rare reazioni cutanee allergiche simili a eczema e, eccezionalmente, reazioni immediate con orticaria. Se nota la comparsa di qualche effetto indesiderato o avverso non menzionato in questo foglio, ne informi il medico o il farmacista.

Precauzioni particolari per la conservazione:

Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C. Non usare dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

Ultima revisione del foglietto illustrativo: 12/2010.

Anno di apposizione del marchio CE: 2011.